

Die **allgemeine quadratische Gleichung** (auch gemischtquadratische Gleichung genannt), lässt sich immer auf die folgende Form bringen:

$$\rightarrow ax^2 + bx + c = 0 \quad \text{mit } a \neq 0$$

Mit den bekannten Mitteln der Äquivalenzumformungen kommen wir nicht zum Ziel. Mit der Methode des quadratischen Ergänzens - welche wir von den quadratischen Funktionen her kennen - jedoch wohl:

$$\begin{aligned}
 ax^2 + bx + c &= 0 && | :a \\
 x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} &= 0 && | \text{ qE} \\
 x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{c}{a} - \left(\frac{b}{2a}\right)^2 &= 0 && | \text{ TU} \\
 \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{c}{a} - \left(\frac{b}{2a}\right)^2 &= 0 && | -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 \\
 \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 && | \text{ TU} \\
 \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= -\frac{4ac}{4a^2} + \frac{b^2}{4a^2} && | \text{ TU} \\
 \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= +\frac{b^2}{4a^2} - \frac{4ac}{4a^2} && | \text{ TU} \\
 \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= +\frac{b^2 - 4ac}{4a^2} && | \sqrt{} \\
 x + \frac{b}{2a} &= \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}} && | -\frac{b}{2a} \\
 x &= -\frac{b}{2a} \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}} && | \text{ TU} \\
 x &= -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} && | \text{ TU} \\
 x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}
 \end{aligned}$$

Die Lösungsformel der allgemeinen quadratischen Gleichung

$$ax^2 + bx + c = 0$$

lautet also:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$



Die Diskussion der Lösungsformel $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$:

1. Im Nenner steht $2a$; daran erkennen wir wieder, dass a nie gleich Null sein darf. Wir sehen es der Gleichung $ax^2 + bx + c = 0$ an, dass bei $a = 0$ eine lineare Gleichung entstehen würde.
2. a) $b^2 - 4ac$ darf nicht negativ sein; aus negativen Zahlen kann man keine Wurzel ziehen; d.h. die Gleichung hat keine Lösung(en).
b) ist $b^2 - 4ac = 0$ so fällt der ganze Wurzelterm weg und die beiden Lösungen fallen zusammen: $x_1 = \frac{-b}{2a}$; d.h. die Gleichung hat genau eine Lösung.
c) ist $b^2 - 4ac > 0$ so hat die Gleichungen zwei verschiedene Lösungen.

Da nun der Term $b^2 - 4ac$ über die Anzahl der Lösungen entscheidet, hat er auch einen eigenen Namen bekommen; man nennt $b^2 - 4ac$ die **Diskriminante**: $D = b^2 - 4ac$

Man kann also sagen:

- | | | | |
|----|---------------|---------|--|
| 1. | Diskriminante | $D < 0$ | Die Gleichung hat keine Lösung(en) |
| 2. | Diskriminante | $D = 0$ | Die Gleichung hat eine Lösung |
| 3. | Diskriminante | $D > 0$ | Die Gleichung hat zwei (verschiedene) Lösungen |

Beispiele:

Berechnen Sie die Diskriminante und entscheiden Sie über die Anzahl der Lösungen:

1. $-2x^2 + 4x - 2 = 0$

2. $-2x^2 + 4x - 3 = 0$

3. $x^2 + 4x - 2 = 0$



Lösungen:

Die Diskussion der Lösungsformel $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$:

1. Im Nenner steht $2a$; daran erkennen wir wieder, dass a nie gleich Null sein darf. Wir sehen es der Gleichung $ax^2 + bx + c = 0$ an, dass bei $a = 0$ eine lineare Gleichung entstehen würde.
2. a) $b^2 - 4ac$ darf nicht negativ sein; aus negativen Zahlen kann man keine Wurzel ziehen; d.h. die Gleichung hat keine Lösung(en).
b) ist $b^2 - 4ac = 0$ so fällt der ganze Wurzelterm weg und die beiden Lösungen fallen zusammen: $x_1 = \frac{-b}{2a}$; d.h. die Gleichung hat genau eine Lösung.
c) ist $b^2 - 4ac > 0$ so hat die Gleichungen zwei verschiedene Lösungen.

Da nun der Term $b^2 - 4ac$ über die Anzahl der Lösungen entscheidet, hat er auch einen eigenen Namen bekommen; man nennt $b^2 - 4ac$ die Diskriminante: $D = b^2 - 4ac$

Man kann also sagen:

- | | | | |
|----|---------------|---------|--|
| 1. | Diskriminante | $D < 0$ | Die Gleichung hat keine Lösung(en) |
| 2. | Diskriminante | $D = 0$ | Die Gleichung hat eine Lösung |
| 3. | Diskriminante | $D > 0$ | Die Gleichung hat zwei (verschiedene) Lösungen |

Beispiele:

Berechnen Sie die Diskriminante und entscheiden Sie über die Anzahl der Lösungen:

1. $-2x^2 + 4x - 2 = 0$
 $D = b^2 - 4ac$ $D = 4^2 - 4(-2) \cdot (-2)$ $D = 0$
Diese Gleichung hat genau eine Lösung.
2. $-2x^2 + 4x - 3 = 0$
 $D = b^2 - 4ac$ $D = 4^2 - 4(-2) \cdot (-3)$ $D = -8$
Diese Gleichung hat keine Lösung(en).
3. $x^2 + 4x - 2 = 0$
 $D = b^2 - 4ac$ $D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2)$ $D = 24$
Diese Gleichung hat zwei Lösungen.